

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Områdesledning vårdkvalitet	Version 5	Antal sidor 1
Dokumentägare Eric Le Brasseur Specialist i allmänmedicin	Fastställare Birgitta Sahlström Verksamhetschef Vaccination Värmland	Giltig fr.o.m. 2024-04-02	Giltig t.o.m. 2026-04-02

## Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade med antikoagulantia

**Gäller för:** Hälso- och sjukvård, Kommunal vård och omsorg

Flera vaccin ges intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion till patienter som behandlas med antikoagulantia finns viss risk för muskelblödning.

Efter vaccination ska injektionsstället komprimeras i 5 minuter.

### Warfarin

**Om patienten behandlas med warfarin (Waran) eller warfarin i kombination med andra läkemedel ska PK-INR kontrolleras**

- *warfarin (Waran) enbart:*  
PK  $\leq$  3.0 och senaste PK-INR högst 1 vecka gammalt
- *warfarin (Waran) i kombination med acetylsalicylsyra (Trombyl):*  
PK  $\leq$  3.0 och senaste PK-INR högst 1 vecka gammalt
- *trippelbehandling: warfarin i kombination med acetylsalicylsyra (Trombyl) och klopido­grel (Plavix) eller prasugrel (Efient):*  
PK  $\leq$  1.8 och PK-INR senaste dygnet eller överväg att senarelägga injektionen

### NOAK

**Om patienten behandlas enbart med NOAK – apixaban (Eliquis), edoxaban (Lixiana), rivaroxaban Xarelto, dabigatran (Pradaxa)**

Ingen dosjustering behöver göras. Tidpunkten för vaccination saknar betydelse.

### Trombocythämmare

**Om patienten behandlas enbart med trombocythämmare – acetylsalicylsyra (Trombyl), ADP-receptorhämmare till exempel klopido­grel (Plavix), ticagrelor (Brilique), prasugrel (Efient)**

Ingen dosjustering behöver dosjustering göras. Tidpunkten för vaccination saknar betydelse.

### LMH (låg­molekylärt heparin)

**Om patienten behandlas med LMH – till exempel dalteparin (Fragmin), tinzaparin (Innohep), enoxaparin (Klexane)**

Ingen dosjustering behöver göras. Tidpunkten för vaccination saknar betydelse.

**Dokumentet är utarbetat av:** Eric Le Brasseur